

Dicopeg Junior Free, na zaparcia dla dzieci od 6 miesiąca, proszek, 30 saszetek



Cena: 55,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Postać	proszek do przygotowania zawiesiny doustnej
Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 6 miesiąca

Opis produktu

Opis

Dicopeg Junior Free, wyrób medyczny o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit. Zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnianie, nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach, nie podrażnia błony śluzowej i jest wydalany z kałem w niezmienionej formie. Preparat wskazany jest dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Zastosowanie

- Przewlekłe zaparcia,
- Sporadyczne przypadki nieregularnej pracy jelit.

Zalecane spożycie

- Od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1-2 saszetki dziennie
- Od 2. do 11. roku życia (od 12 kg do 20 kg): 2-4 saszetki dziennie
- Powyżej 11. roku życia (lub > 20 kg): 2-6 saszetek dziennie
- Rozpuścić saszetkę (5 g) w ok. 62,5 ml wody lub innego płynu: herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub soki owocowe.
- Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach.
- Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości płynu i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny.
- Zaleca się zażywać Dicopeg Junior Free w długich odstępach czasu od posiłków.

Skład

Każda saszetka zawiera 5 g makroglu 3350.

Przechowywanie

- Nienaruszone opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie preparatu nie jest wskazane w przypadku: perforacji lub niedrożności jelit spowodowanej zaburzeniami budowy lub działania ścian jelit, jelita krętego, w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy.
- Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z wcześniej otwartej saszetki (narażenie na ryzyko skażenia produktu).

Nie stosować:

- u Dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
- Przy nadwrażliwości na makrogol (glikol polietylenowy).
- Przy uszkodzeniu żołądka lub jelit.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanych dawek.