


Dicopeg Liquid, na zaparcia dla dzieci od 6 miesiąca, 10 saszetek



Cena: 31,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Postać	płyn
Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 6 miesiąca

Opis produktu

Opis

Dicopeg Liquid, wyrób medyczny leczniczy o osmotycznym działaniu przeczyszczającym. Zawiera makrogol, dzięki temu preparat pobudza perystaltykę, wspomaga regularne wypróżnianie i w ten sposób zapobiega zaparciom oraz tworzeniu się zbitych mas kałowych.

Zastosowanie

Do objawowego leczenia zaparcí.

Sposób użycia

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: od 2 do 8 saszetek dziennie. Maksymalna skuteczna dawka zwykle nie przekracza 8 saszetek dziennie. Roztwór doustny należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produktu należy wypić około 60 ml wody na każdą saszetkę. Jeżeli ma być przyjęta minimalna dawka (2 saszetki dziennie), zaleca się przyjęcie jej rano. W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.
- Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat: od 6 do 10 kg: 1 saszetka dziennie; od 10 do 15 kg: 1-2 saszetki dziennie; od 16 do 20 kg: 2-3 saszetki dziennie; od 21 do 43 kg: 3-4 saszetki dziennie. Maksymalna skuteczna dawka zwykle nie przekracza 4 saszetek dziennie. Roztwór doustny należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produktu należy wypić około 60 ml wody na każdą saszetkę. Jeżeli ma być przyjęta minimalna dawka (1 saszetka dziennie), zaleca się jej przyjęcie rano. W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.
- Aby uregulować wydalanie miękkiego stolca, dawki należy zwiększać lub zmniejszać, w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Jeżeli pacjent nie zauważy poprawy po 7 dniach leczenia, powinien skonsultować się z lekarzem.

Skład

Woda oczyszczona, makrogol, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, benzoesan sodu, sukraloza. Nie zawiera glutenu.

Przechowywanie

- Chronić przed dziećmi i przechowywać w miejscu niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy przyjmować preparatu w następujących przypadkach: stwierdzona nadwrażliwość na jeden lub więcej składników; porażenna niedrożność jelit; perforacja, niedrożność lub zwężenie jelit; poważne choroby zapalne jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, ostre rozdęcie okrężnicy).

Stosowanie środków przeczyszczających jest przeciwwskazane w przypadku ostrego bólu w jamie brzusznej lub nieznanego pochodzenia, nudności i wymiotów, krwawienia z odbytnicy nieznanego pochodzenia oraz w przypadku ciężkiego odwodnienia.

Dodatkowe informacje

- Zaleca się, aby u dzieci produkt stosować po konsultacji z lekarzem. Podawanie dzieciom powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przed stosowaniem w czasie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu. Nie stosować, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Produkt może skracać czas pasażu jelitowego i tym samym wchłanianie leków stosowanych doustnie. W związku z tym, wskazane jest, aby skonsultować się z lekarzem w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków doustnych, które w każdym przypadku muszą być podawane w odstępie co najmniej 2 godzin od przyjęcia dawki Dicopeg Liquid. W przypadku działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.