

DicoStop, 15 g x 4 saszetki



Cena: 9,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	4 saszetki
Producent	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Diosmektyt to naturalna glinika o strukturze cienkich nakładających się na siebie krystalicznych płytek, posiadających dużą zdolność chłoną, co umożliwia absorpcję płynów obecnych w świetle jelita wraz z obecnymi w nim bakteriami i wirusami, zagęszczanie konsystencji stolca i spowolnienie wydalania. Diosmektyt zawarty w preparacie DicoStop łączy się z glikoproteinami warstwy śluzowej pokrywającej ścianę przewodu pokarmowego, zmieniając ich charakterystykę fizyczną, tworząc chłonny żel, który chroni przed nadmiernym wydzielaniem kwasu i substancjami drażniącymi żołądek, a także stanowi barierę przeciw mechanizmom zapalnym.

Zastosowanie

Doustne leczenie ostrych i przewlekłych biegunek i dolegliwości bólowych związanych z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego.

Zalecane spożycie

- Dorośli: 1 saszetka 3 x dziennie.
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 saszetka 2-3 x dziennie.
- Dzieci w wieku 2-6 lat: 1 saszetka 1-2 x dziennie.
- Każda saszetka może być użyta tylko raz po jej otwarciu.
- Ugnieść energicznie zawartość saszetki przed jej otwarciem.
- Można przyjmować bezpośrednio lub rozpuścić w szklance wody lub w innych napojach (sok, jogurt).
- Po otwarciu, zawartość saszetki powinna być przyjęta w całości, produkt jest jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu nie mogą być przyjęte później w ciągu dnia.
- Małym dzieciom zawartość saszetki można podać w butelce do karmienia, po zmieszaniu z 50 ml wody lub innego napoju, podzieloną na 2-3 dawki w ciągu dnia.
- Można dodać preparat do pokarmów półpłynnych.
- Doradza się przyjmowanie preparatu pomiędzy posiłkami.
- W leczeniu ostrej biegunki należy stosować doustny płyn nawadniający (DPN) w celu uniknięcia odwodnienia.

Skład

1 saszetka zawiera: Składnik aktywny: diosmektyt (1,5 g).

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, EDTA, guma karaya, metyloparaben sodowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, aromaty, kwas cytrynowy, benzoesan sodowy, sukraloza.

Przechowywanie

- W temperaturze pokojowej (15-25°C); unikać ekspozycji na bezpośrednie źródła światła, ciepło i nadmierną wilgotność.
- Poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia.
- Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki tego wyrobu medycznego.
- Nie stosować dłużej niż 10 kolejnych dni. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli biegunka utrzymuje się przez więcej niż 3 dni, należy zwrócić się po poradę medyczną.
- Nie stosować w przypadku uszkodzeń żołądka lub jelit lub w przewlekłym zaparciu lub podrażnieniu i niedrożności jelit.
- Wyrób medyczny zawiera aluminium pochodzące z diosmektytu; jeżeli stosowane są inne produkty lub leki zawierające diosmektyt, glinkę lub związek aluminium, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu DicoStop.
- Nie stosować tego wyrobu medycznego podczas używania innych wyrobów lub leków doustnych: zdolność chłonna diosmektytu może niekorzystnie wpływać na ich skuteczność. W przypadku stosowania równoczesnych terapii lekowych, przed przyjęciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie przyjmować wyrobu w pozycji leżącej.
- Nie stosować wyrobu po dacie ważności podanej na pudełku i saszetce.
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie przekraczać zalecanej dawki, w przypadku działań niepożądanych (zaparcie, bóle jelit, wzdęcia) przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.