Dip Rilif (50 mg + 30 mg)/g, żel, 50 g

Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 g
Dawka	(50 mg + 30 mg)/g
Opakowanie	50 g
Postać	żel
Producent	COLEP LAUPHEIM GMBH & CO. KG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum, Mentholum

Opis produktu

Opis
Dip Rilif, lek w postaci żelu. Zawiera ibuprofen i mentol. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Skojarzone działanie obu składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.

Wskazania
Do miejscowego leczenia:

- W bólach reumatycznych, w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bólach pleców, lumbago (postrzale), bólach mięśniowych, bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.
- Bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalne.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- Nałożyć cienką warstwę żelu na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia się produktu leczniczego.
- Czynność powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu.

Skład
Substancjami czynnymi leku są 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu w 1 g żelu.

Pozostałe składniki to: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (glikol propylenowy, diizopropanolamina, karbomer, etanol 96%, woda oczyszczona).
- Astma, występujące w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak: podrażnienie i zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd, pieczenie, pokrzywka, oparzenia w miejscu stosowania.
- Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, niestrawność.
- Zaburzenia układu immunologicznego: mogą to być reakcje nadwrażliwości po zastosowaniu ibuprofenu takie jak: niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja; napady astmy, napady duszności, skurcz oskrzeli; reakcje skórne różnego typu, wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i znacznie rzadziej, pęcherzyca (włączając martwicę skórną i rumień wielopostaciowy).

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosować wyłącznie zewnętrznie, a po aplikacji należy dokładnie umyć ręce, chyba że są miejscem stosowania leku.
- Unikać kontaktu leku ze skórą uszkodzoną lub zmienioną zapalnie oraz nie stosować w okolicy oczu i błon śluzowych.
- Jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie.
- Żel nie może być stosowany pod opatrunkami lub bandażami.
- Jeśli objawy nie ustępują po okresie dwóch tygodni, należy skierować się do lekarza.
- Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: osób z chorobą nerek, czynną chorobą wrzodową, jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, alergii na leki lub kosmetyki, kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
- W razie połknięcia żelu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.