

# Dobenox Forte 500 mg, 60 tabletek



Cena: 51,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	60 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekan
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Calcii dobesilas
Wiek	od 18 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Dobenox Forte, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawarta substancja czynna wapnia dobezylan jednowodny usprawnia krążenie żyłne i działa ochronnie na naczynia krwionośne.

### Wskazania

- Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (ból i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastój krwi), żylaki kończyn dolnych.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu.

### Działanie

- Usprawnia krążenie żyłne i działa ochronnie na naczynia krwionośne.
- Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych.

### Dawkowanie

Dorośli: zwykle od 1 do 2 tabletki na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg substancji czynnej - dobezylanu wapnia jednowodnego):

- Niewydolność żylna - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę;
- Żylaki odbytu - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę.

### Skład

1 tabletk zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilasmonohydricus).

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

### Działania niepożądane

- Występujące rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów.
- Występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.

### Przechowywanie

- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby – agranulocytozy.

- Lek Dobenox Forte a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Dobenox Forte z jedzeniem i pić: lek należy stosować po posiłkach w celu uniknięcia lub ograniczenia objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.
- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek Dobenox Forte zawiera laktozę: jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

1 tabletkę leku Dobenox Forte zawiera 50 mg laktozy.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.