

Dolgit 50 mg/ g, krem, 150 g



Cena: 44,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	150 g
Dawka	50 mg/g
Opakowanie	150 g
Postać	krem
Producent	DOLORGIET GMBH & CO. KG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Opis

Dolgit, lek w postaci kremu. Substancją czynną leku jest ibuprofen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Wskazania

- Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgniastych, więzadeł i torebek stawowych);
- Miejscowe leczenie bólów mięśni;
- Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Działanie

- Przeciwzapalnie.
- Przeciwbólowo.

Dawkowanie

- Nałożyć i wetrzeć w skórę pasek kremu o długości 4 cm do 10 cm, 3 do 4 razy na dobę, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
- W razie konieczności produkt leczniczy można stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.

Skład

- Substancja czynna: ibuprofenum.
- Pozostałe składniki: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerolu monostearynian, makrogolo-30-glicerolu monostearynian, makrogolo-100-glicerolu monostearynian, glikol propylenowy, metylu

parahydroksybenzoesan sodowy, guma ksantyn, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
- Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.