


Dolomit VIS 64 mg + 108 mg, 100 tabletek



Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	64 mg + 108 mg, 100 tabletek
Opakowanie	100 tabletek
Postać	tabletki
Producent	VIS - ZAKŁADY CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesii carbonas, Calcium carbonate

Opis produktu

Opis

Dolomit VIS, lek w postaci tabletek jest naturalnym minerałem zawierającym głównie węglan wapnia i węglan magnezu oraz niewielkie ilości jonów: żelaza, glinu, krzemu, manganu, cynku i miedzi. Dzielne zapotrzebowanie organizmu człowieka na wapń wynosi 700-800 mg a na magnez 270-350 mg.

Wskazania

- Lecznio w celu wyrównania gospodarki wapniowo-magnezowej organizmu w stanach hipokalcemii i hipomagnezemii oraz profilaktycznie dla zapobiegania i powstawania niedoborów wapnia i magnezu.
- Profilaktycznie w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego, wzmożonej drażliwości, sytuacjach stresowych, zaburzeniach snu, bólach mięśni, przy

dłuższym wysiłku fizycznym, w okresach szybkiego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży i laktacji.

- Profilaktycznie w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach i złamaniach kości.
- U kobiet w okresie menopauzy, w zapobieganiu demineralizacji kości oraz wspomagająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Działanie

Wyrównywanie gospodarki wapniowo-magnezowej.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- profilaktycznie 1 tabletkę na dobę;
- leczniczo w stanach niedoboru wapnia i magnezu 1 do 3 tabletek na dobę, zależnie od wielkości niedoboru.

- Lek stosować po posiłku, popijając wodą.

Skład

1 tabletkę (500 mg dolomitu) zawiera: magnezu węglan i wapnia węglan, (co odpowiada 64 mg jonów magnezu i 108 mg jonów wapnia) oraz substancje pomocnicze: talk, laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, magnezu stearynian, żelatynę.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia (podwyższenie stężenia wapnia we krwi), hipermagnezemia (nadmiar magnezu), blok przedsionkowo-komorowy, miastenia (autoimmunologiczna choroba nerwowo-mięśniowa), bezmocz, choroby nerek z zaburzeniami filtracji oraz znaczne obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi.
- Nie stosować w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz glikozydami naparstnicy.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Rozwijające się nowotwory złośliwe, ponieważ magnez mógłby pobudzić ich wzrost.

Działania niepożądane

- Zaburzenia żołądka i jelit Nudności, wymioty, luźne stolce - częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Przy dłuższym stosowaniu mogą wystąpić objawy senności stolce - częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, łagodna hiperkalcuria (zaburzenia gospodarki wapniowej) lub kamica nerkowa, ponieważ wymagana jest wówczas kontrola wydalania wapnia z moczem. Pacjenci z kamicią nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów. Podczas leczenia należy kontrolować stężenie wapnia we krwi.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Kobiety w ciąży i okresie karmienia piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.