

Doppelherz aktiv Ginkgo Duo na krążenie mózgowe i żyłne, 60 kapsułek



Cena: 27,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 kapsułek
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Doppelherz aktiv Ginkgo Duo na krążenie mózgowe i żyłne, suplement diety w postaci kapsułek. Zawiera ginkgo biloba (miłorząb japoński), który wspomaga wydolność umysłową, pozwala zachować prawidłowe funkcje kojarzenia i zapamiętywania u osób starszych. Ma także korzystny wpływ na krążenie żyłne w kończynach. Kwas tłuszczowy DHA (typu omega-3) wspomaga prawidłowe funkcje mózgu a witaminy z grupy B (tiamina /B1, niacyna/B3, kwas pantotenowy/B5, wit.B12). Witamina B5 wspomaga funkcje umysłowe i sprawność umysłową.

Zastosowanie

Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety Doppelherz aktiv Ginkgo Duo na krążenie mózgowe i żyłne. Szczególnie w okresach intensywnej pracy układu nerwowego i u osób starszych.

Zalecane spożycie

- Dziennie: 1 kapsułka po posiłku; popić obficie.
- Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej 2-3 miesięczne stosowanie.

Skład

Olej rybi (min. 35% omega-3), żelatyna, subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba, DER 50:1), olej sojowy rafinowany, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: wosk pszczeli biały i żółty, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, octan alfa-tokoferylu (witamina E), amid kwasu nikotynowego (witamina B3), D-pantotnian wapnia (witamina B5), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, cyjanokobalamina (wit.B12), barwnik: dwutlenek tytanu, monoazotan tiaminy (witamina B1), barwnik: kompleks miedziowy chlorofiliny.

1 kapsułka zawiera: Ginkgo biloba (wyciąg) 50 mg, Olej z ryb morskich (z omega-3) 500 mg (kwasy tłuszczowe DHA 60 mg), Tiamina

(witamina B1) 0,55 mg (50%)*, Niacyna (witamina B3) 8 mg (50%)*, Kwas pantotenowy (witamina B5) 4,5 mg (75%)*, Witamina B12 1,25 µg (50%)*, Witamina E 6 mg (50%)*.

*RWS- referencyjna wartość spożycia.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania równocześnie z lekami przeciwzapalnymi lub przeciwzakrzepowymi (np. aspiryna, ibuprofen, klopidogrel), przy zmniejszonej krzepliwości krwi lub na tydzień przed operacją.
- Skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przy stosowaniu leków na nadciśnienie (diltiazem, nifedypina) lub przeciwpadaczkowych.
- Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią ani przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Dodatkowe informacje

- Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.