

Doppelherz aktiv Kolagen 1000 Stawy, 20 kapsułek



Cena: 28,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Suplement diety
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Opis

Doppelherz aktiv Kolagen 1000 Stawy, suplement diety w postaci kapsułek. Przeznaczony dla osób dorosłych. Zawiera kompozycję składników wchodzących w skład chrząstki i mazi stawowej.

Zastosowanie

- Brak aktywności ruchowej (np. siedząca praca) lub nadwaga.
- Starszy wiek.
- Przy uprawianiu sportu lub intensywnej pracy fizycznej.

Zalecane spożycie

1-2 kapsułki dziennie po posiłku, popić obficie wodą.

- Nie zaleca się stosowania na czczo.
- Zaleca się stosowanie regularne przez minimum 3 miesiące.

Skład

Hydrolizowany kolagen zawierający kwas hialuronowy, substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy, żelatyna, siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy KCL ze skorupiaków, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

- 1 kapsułka zawiera: Hydrolizowany kolagen 500 mg, w tym kwas hialuronowy 50 mg, siarczan chondroityny 100 mg, w tym chondroityna 80 mg, siarczan glukozaminy KCL 53 mg, w tym glukozamina 24 mg.
- 2 kapsułki zawierają: Hydrolizowany kolagen 1000 mg, w tym kwas hialuronowy 100 mg, siarczan chondroityny 200 mg, w tym chondroityna 160 mg, siarczan glukozaminy KCL 106 mg, w tym glukozamina 48 mg.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u dzieci i młodzieży.
- Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Dodatkowe informacje

- Preparat może być stosowany przez osoby nietolerujące laktozy.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.
- Osoby z upośledzoną tolerancją glukozy powinny monitorować poziom cukru we krwi i zapotrzebowanie na insulinę.
- Osoby stosujące antykoagulanty kumaryny powinny spożywać ten produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Należy monitorować parametry krzepnięcia krwi.