

Doppelherz aktiv Na stres i przemęczenie + Magnez, 30 tabletek



Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Doppelherz aktiv na stres i przemęczenie + magnez to suplement diety zawierający wysoce przyswajalny magnez z dodatkiem melisy, witaminy D, tiaminy, niacyny i witaminy B6.

- Magnez- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego.
- Melisa- wspomaga dobre samopoczucie i wykazuje działanie relaksacyjne.
- Tianina, niacyna, witamina B6- wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,

Zastosowanie

- W stanach napięcia i przemęczenia
- Wspomagająco prawidłowe funkcjonowanie mięśni
- Przy trudnościach z zasypianiem

Zalecane spożycie

- Stosować 1 tabletkę dziennie, najlepiej po posiłku.
- Nie stosować na czczo.
- Dla ułatwienia połknięcia tabletkę można dzielić.

Skład	Dzienna porcja do spożycia, zawiera:	Ilość	%RWS*
	- Magnez	400 mg	107%
	- Wyciąg z liści melisy	100 mg	

- Olejek lawendowy	5 mg	
- Tiamina	1,1 mg	100%
- Niacyna	16 mg	100%
- Witamina B6	1,4 mg	100%
- Witamina D	5 µg	100%

*referencyjna wartość spożycia

Tlenek magnezu, substancja wypełniająca: węglan wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści melisy (*Melissa officinalis*), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, olej palmowy całkowicie uwodorniony, substancja przeciwzbrylająca: hydroksywęglan magnezu, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, maltodekstryna, substancja wypełniająca: guma arabska, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, olejek lawendowy (*Lavandula angustifolia*), cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy stosowaniu powyżej 1 miesiąca zaleca się stosowanie co drugi dzień.