

## Doppelherz Med Na drażliwe jelita, 30 tabletek



Cena: 28,99 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Doppelherz Med Na drażliwe jelita, wyrób medyczny w postaci tabletek. Leczy i przynosi ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego, takie jak ból, obrzęk, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej, związanymi lub nie ze zmianą wyglądu stolca oraz z zaburzeniami rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunka lub ich naprzemienne występowanie). Absorbuje gazy jelitowe i tworzy ochronny film na błonie śluzowej jelita. Zawiera tyndalizowane bakterie, które przylegają jak plaster do uszkodzonej ścianki jelita

#### Zastosowanie

Wspomaganie leczenia zespołu jelita drażliwego (IBS).

#### Zalecane spożycie

- 1 tabletkę 2 razy dziennie.
- Tabletki powinny być przyjmowane przed jedzeniem lub pomiędzy posiłkami lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
- W przypadku ostrego bólu dawkę można podwoić.
- W zależności od nasilenia choroby, zaleca się przedłużyć stosowanie z 2 do 6 tygodni i powtarzać leczenie w przypadku ponownego pojawienia się objawów.

#### Skład

Zeolit (klinoptylolit), wyciąg z rumianku pospolitego (*Matricaria chamomilla* L.), wyciąg z prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis* L.), aloes (*Aloe vera* L., sok z żelu 200:1, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tyndalizowane bakterie *Lactobacillus plantarum* (zawiera soję, mleko i produkty mleczne, w tym laktozę), celuloza, fosforany wapnia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, olejek eteryczny z kopru włoskiego (*Foeniculum vulgare* Mill.), olejek eteryczny z kminku zwyczajnego (*Carum carvi* L.).

#### Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C w suchym, chłodnym miejscu, chronić od światła.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania wyrobu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia. W takich przypadkach, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego wyrobu medycznego.
- Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki dziennie.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.