


Dulcobis 10 mg, 10 czopków



Cena: 28,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	10 czopków
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Bisacodylum

Opis produktu

Opis

Dulcobis, lek w postaci czopków. Zawiera substancję czynną bisakodyl, który działa miejscowo przeczyszczająco. Pobudza naturalny proces wypróżniania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. W postaci czopków działa szybko już od 10-45 min od aplikacji przynosząc zdecydowaną ulgę w zaparciach.

Wskazania

- Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć.
- W przygotowaniu do badań diagnostycznych.
- W leczeniu przed- i pooperacyjnym.
- W stanach wymagających ułatwienia defekacji.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

- 1 czopek na dobę.
- Stosować maksymalnie do 5 dni.
- Sposób stosowania: umieścić rozpakowany uprzednio czopek w odbycie, zaostrozonym końcem. Działa po 10-45 minutach.
- Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych: stosować wyłącznie pod nadzorem personelu medycznego i zgodnie z zaleceniami lekarza.
- W krótkotrwałym leczeniu zaparć:
- Dorośli: zalecana dawka to 1 czopek (10 mg) na dobę.
- Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: zalecana dawka to 1 czopek (10 mg) na dobę.
- W przygotowaniu do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych (produkt powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego):

- Dorośli: zalecana dawka to 2-4 tabletki (10-20 mg) 5 mg, tabletki dojelitowe wieczorem w dniu poprzedzającym badanie.
- Następnego dnia rano zalecane jest zastosowanie doodbytnicze 1 czopka produktu leczniczego Dulcobis, 10 mg, czopki.

Skład

1 czopek zawiera: 10 mg bisacodylu, Substancje pomocnicze: tłuszcz stały (Witepsol W 45)

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na bisakodyl lub substancję pomocniczą.
- Niedrożność jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit.
- Silne bóle brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób.
- Dzieci poniżej 10 lat.
- W stanach, w których może występować zaburzenie równowagi elektrolitowej np. w stanach ciężkiego odwodnienia.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.