

Dulcobis, 60 tabletek dojelitowych



Cena: 35,10 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 mg
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki dojelitowe
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Bisacodylum

Opis produktu

Opis

Dulcobis, lek przeczyszczający, przynoszący szybszą ulgę w zaparciach, działa już po 6 godzinach. Przyspiesza perystaltykę jelita i zwiększa zawartość wody i elektrolitów w jelicie, dzięki czemu ułatwia wypróżnianie.

Wskazania

- Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć.
- W przygotowaniu do badań diagnostycznych.
- W leczeniu przed-po i pooperacyjnym.
- W stanach wymagających ułatwienia defekacji.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

- W krótkotrwałym leczeniu zaparć

Dorośli i młodzież: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem.

Dzieci 4-10 lat: 1 tabletki dojelitowa (5 mg) na dobę przed snem.

- W przygotowaniu do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych (Produkt powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego):

Dorośli i młodzież: 2-4 tabletki dojelitowe (10-20 mg) wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).

Dzieci 4-10 lat: 1 tabletki dojelitowa (5 mg) wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka

przecyszczającego (np. czopka).

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Skład

1 tabletkę dojelitową zawiera: 5 mg bisacodylu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85%, magnezu stearynian, otoczka tabletki (magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E172), wosk biały, wosk Carnauba, szelak).

Przeciwwskazania

- Niedrożność jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób.
- Stany ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakiegokolwiek inny składnik produktu.
- W przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu, stosowanie produktu jest przeciwwskazane.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.