

DulcoSoft Junior, roztwór na zaparcia od 2 roku życia, 100 ml



Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Opakowanie	100 ml
Postać	proszek do sporządzenia roztworu doustnego
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 2 roku życia

Opis produktu

Opis

Data ważności: 30.04.2023 r.

DulcoSoft Junior, wyrób medyczny o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, którego głównym składnikiem jest makrogol 4000. DulcoSoft Junior zmiękcza twarde masy kałowe, co prowadzi do nasilenia perystaltyki jelitowej i ułatwia wypróżnianie. DulcoSoft Junior posiada neutralny smak i zapach.

Zastosowanie

- Objawowe leczenie zaparć,
- Zmiękczenie twardej masy kałowej,
- Ostre i przewlekłe zaparcia.

Zalecane spożycie

- Produkt można bezpośrednio zmieszać z wybranym napojem, np. ze szklanką wody, soku owocowego lub herbaty (około 150 ml).

Dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20 – 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 – 20 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

W przypadku stosowania produktu u dzieci poniżej 8 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16 – 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 – 16 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 – 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 – 8 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

Dawkę należy odmierzyć przy użyciu miarki dołączonej do opakowania. Dawkę można dostosowywać w zależności od uzyskiwanego efektu. Uwzględniając zalecenia dotyczące dawkowania, dawkę można dostosować do własnych potrzeb i przyjmować codziennie lub co drugi dzień. Właściwą dawką jest najmniejsza dawka zapewniająca regularne oddawanie miękkich stolców.

Skład

10 ml płynu DulcoSoft Junior zawiera 5 g makrogolu 4000.

Roztwór jest dostępny w opakowaniach po 100 ml.

Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (zob. informację o składzie).
- ciężkiej zapalnej choroby jelit (taka jak wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozdęcie okrężnicy.
- wystąpienie lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego.
- porażenna niedrożność jelit bądź też podejrzenie niedrożności jelit lub objawowego zwężenia jelit.
- brzuszne zespoły bólowe o nieokreślonej przyczynie.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich środków przeczyszczających, przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć chorobę organiczną.
- Wyrobu medycznego DulcoSoft Junior nie należy przyjmować codziennie w sposób ciągły przez dłuższy okres bez zbadania przyczyny zaparcia. W przypadku

utrzymujących się bólów brzucha należy zwrócić się o poradę medyczną.

- W przypadku biegunki należy zachować ostrożność u pacjentów podatnych na zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej (np. pacjentów w podeszłym wieku, osób

z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek bądź też pacjentów stosujących leki moczopędne) i należy rozważyć monitorowanie stężeń elektrolitów.

- U pacjentów przyjmujących produkty zawierające makrogol mogą wystąpić stany alergiczne (takie jak wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk

naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i nadwrażliwość).

- Jeżeli pacjent zauważy u siebie któryś z powyższych objawów, powinien przestać stosować produkt DulcoSoft Junior i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

- Produkt nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 2 roku życia.
- Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Roztwór nie zawiera cukru.
- DulcoSoft Junior zazwyczaj zaczyna działać po 1 – 3 dniach stosowania. Badania kliniczne potwierdzają, że w przypadku regularnego przyjmowania produktu

wypróżnienia zazwyczaj występują raz na dobę. Jeżeli zaparcia będą się utrzymywać, należy zbadać ich przyczynę. Dzieci nie powinny stosować produktu

DulcoSoft Junior przez okres dłuższy niż 3 miesiące