

Echinasal, syrop, na odporność, 125 g



Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Preparat ziołowy

Opis produktu

Wskazania

- Profilaktycznie w okresach zmniejszonej odporności.
- Pomocniczo w łagodnych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z objawami kaszlu (np. w przebiegu przeziębienia).

Działanie

Lek pobudzający odporność organizmu.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dzieci od 7 do 12 lat – 2 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml), młodzież powyżej 12 lat i dorośli – 3 do 4 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml).
- Czas trwania kuracji nie powinien dłuższy niż 10 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po kilku dniach należy zasięgnąć opinii lekarza.
- Profilaktycznie (np. w okresach występowania wzmożonych infekcji dróg oddechowych) należy stosować połowę dawek leczniczych: dzieci od 7 do 12 lat – 1 raz na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml), młodzież powyżej 12 lat i dorośli – 2 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml). Stosowanie profilaktyczne leku wymaga wielodniowego podawania, jednak nie dłużej niż 20 dni.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Wyciąg złożony (1:4,4) z: liścia babki lancetowatej (3 cz.), ziela grindelii (1 cz.), owocu róży (1 cz.) – 5 g (Ekstrahent: etanol 50% v/v), Wyciąg z ziela tymianku (1:4) – 3 g (Ekstrahent mieszanina: etanol 30% v/v, gliceryna, woda amoniakalna 25%), Sok z ziela jeżówki purpurowej (1:1) – 2 g

Substancje pomocnicze to: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki.

Syrop zawiera do 1% (m/m) etanolu.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Uczulenie na rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae =Compositae), takie jak np.: rumianek, nagietek, krwawnik, mniszek, arnika,
- Choroby układowe: gruźlica, białaczka, AIDS, zakażenia wirusem HIV, stwardnienie rozsiane, kolagenozy (choroby tkanki łącznej), schorzenia autoimmunologiczne (choroby, których podłożem jest reakcja układu odpornościowego skierowana przeciw własnym tkankom organizmu).

Działania niepożądane

Częstość nieznana: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg na dawkę).
- Nie zaleca się podawania dzieciom w wieku poniżej 3 lat. U dzieci w wieku od 3 do 7 lat należy stosować wyłącznie po konsultacji lekarskiej.
- Jeśli pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.