

Echinerba 100 mg Labofarm, 30 tabletek



Cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Echinaceae purpureae herbae extractum siccum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Pomocniczo w chorobach przeziębieniowych.

Działanie

Wsparcie podczas przeziębienia.

Dawkowanie

- Podawać doustnie.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę.
- Czas podawania nie powinien być dłuższy niż 10 dni.

Skład

Echinaceae purpureae herbae extractum siccum (3,5-4,5 : 1) - 100 mg

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian.

Jedna tabletki zawiera nie mniej niż 1 mg kwasów polifenolowych w przeliczeniu na kwas chlorogenowy.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae).
- choroby przebiegające z zaburzeniami odporności: gruźlica, zakażenia wirusem HIV oraz AIDS, białaczek, chorób autoimmunologicznych, jak np. stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy).
- Nie należy też stosować w przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

Działania niepożądane

Po zastosowaniu preparatów zawierających ziele jeżówki purpurowej mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quincke'go, skurcz oskrzeli, astma i wstrząs anafilaktyczny). U pacjentów atopowych jeżówka może spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną. W przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni, może wystąpić leukopenia. W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, duszności lub innych niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie u osób z rozpoznaną alergią (wziewną, skórą, pokarmową) należy skonsultować z lekarzem. Jeśli objawy przeziębienia nie ustąpią po 10 dniach, nasilają się lub przeziębieniu towarzyszy gorączka, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.