

## Ectifem, 10 globulek



Cena: 31,90 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 globulek
Postać	globulki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Ectifem, nawilżające globulki dopochwowe z ektoiną i kwasem hialuronowym. Globulka rozpuszcza się w pochwie, powlekając ją nawilżającą warstwą, chroniącą błonę śluzową przed podrażnieniami. Ektoina i kwas hialuronowy wspomagają prawidłowy poziom nawilżenia błony śluzowej pochwy, łagodząc uczucie suchości, napięcia, pieczenie i świąd. Dodatkowo ektoina wykazuje właściwości chroniące komórki, łagodzące stany zapalne oraz stabilizujące błony komórkowe.

#### Zastosowanie

Dla kobiet w celu:

- łagodzenia uczucia suchości i dyskomfortu (pieczenie, świąd, napięcie),
- przywrócenie prawidłowego poziomu nawilżenia błony śluzowej pochwy w stanach związanych ze zmianami hormonalnymi we wszystkich okresach życia, w tym w okresie menopauzy,
- wspomaganie regeneracji błony śluzowej pochwy i łagodzenia objawów spowodowanych przyjmowaniem leków oraz będących następstwem chemo- i radioterapii,
- łagodzenia bólu w przypadku bolesnych stosunków.

#### Sposób użycia

- Kuracja wstępna: 1 globulka dopochwowa dziennie, najlepiej przed snem, przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Kuracja podtrzymująca: 1 globulka dopochwowa 2-3 razy w tygodniu lub według wskazań lekarza.

#### Skład

Ektoina (Ectoin®), kwas hialuronowy, Witepsol S58.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

- Nie połykać.
- Nie stosować podczas menstruacji oraz na uszkodzoną błonę śluzową pochwy.
- Nie stosować preparatu jednocześnie z innymi preparatami dopochwowymi bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości należy zaprzestać stosowania.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone.
- Nie używać po upływie terminu ważności. Data ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego.