

## Ectifem, żel na suchość i objawy atrofii pochwy, 30 ml



Cena: 31,99 zł

### Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Opakowanie	30 ml
Postać	żel dopochwowy
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 18 roku życia

### Opis produktu

#### Opis

Ectifem, wyrób medyczny do pielęgnacji intymnej. Bezbarwny, półprzezroczysty, niehormonalny żel nawilżający do łagodzenia suchości pochwy i atrofii pochwy. Skuteczność oparta jest na 100% naturalnych składników. Może być stosowany razem z ogólnoustrojowymi terapiami hormonalnymi. Żel zawiera ectoinę (Ectoin®), naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, o właściwościach zmniejszających stan zapalny i stabilizujących błony komórkowe. Nawilża suchą błonę śluzową pochwy i pomaga zmniejszyć objawy atrofii pochwy, takie jak suchość, swędzenie i pieczenie.

W oparciu o dane przedkliniczne, dzięki zastosowaniu Ectoin® Hydro Complex żel stabilizuje błony komórkowe śluzówki, utrzymuje nawilżenie i wspomaga proces regeneracji.

Wyrób medyczny żel nie zawiera substancji zapachowych, barwników, olejów mineralnych, alkoholu i hormonów.

#### Zastosowanie

Leczenie pierwszych objawów dyskomfortu pochwy, przeznaczony dla osób dorosłych.

#### Sposób użycia

- Wyrób medyczny należy zawsze używać zgodnie z instrukcją użytkowania. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej żel aplikować raz dziennie, najlepiej wieczorem, co najmniej 1 godzinę przed snem (jeśli jest taka konieczność należy użyć wkładek higienicznych). W razie potrzeby żel może być używany rzadziej (z odstępem jednego / dwóch / trzech dni).
- Należy dokładnie umyć ręce i zachować ogólną higienę przed zastosowaniem.
- Aplikowanie zimnego żelu może powodować nieprzyjemne uczucie. Przed użyciem należy upewnić się, że tuba ma temperaturę pokojową.
- **Bez aplikatora:** odpowiednią ilość żelu należy nałożyć na czysty palec i delikatnie wmasować w zewnętrzne okolice narządów płciowych i / lub wewnątrz pochwy.
- **Z aplikatorem:** otworzyć tubkę trzymając ją pionowo, końcówką skierowaną do góry. Nałożyć aplikator dopochwowy na końcówkę tubki. Ostrożnie ścisnąć tubkę, aż tłok aplikatora zatrzyma się i aplikator zostanie napełniony żelem. Wyjąć aplikator z tuby, ostrożnie pociągając/przekręcając, a następnie zamknąć tubkę. Ułożyć się w wygodnej pozycji do wprowadzenia aplikatora do pochwy (np. leżąc na plecach lub w najlepszej dla siebie pozycji do wprowadzenia produktu) i ostrożnie włożyć aplikator do pochwy. Delikatnie nacisnąć tłok aplikatora, aż do zatrzymania i uwolnienia całego żelu do pochwy. Wyjąć aplikator z pochwy. Aplikator należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu.

Aby wyczyścić aplikator należy:

- zdemontować aplikator poprzez wyciągnięcie tłoka z tuby. W tym celu tłok należy mocno docisnąć kulistym końcem tłoka do twardej powierzchni.
- umyć rurkę i tłok letnią wodą z kranu i łagodnym mydłem, dokładnie opłukać rurkę i tłok wodą z kranu, w razie potrzeby strząsnąć nadmiar wody.
- pozostawić części aplikatora do wyschnięcia na suchej i czystej powierzchni
- ponownie zmontować aplikator, wkładając tłok do rurki.

Nie używać jednego aplikatora więcej niż 20 razy.

#### Skład

Ektoina (Ectoin®), woda, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, mleczan sodu, benzoosan sodu, glikol propylenowy.

#### Przechowywanie

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W temperaturze od 2°C do 25°C.
- Nie stosować dłużej niż 3 miesiące po otwarciu.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę (Ectoin®), glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników żelu.
- Jeśli wystąpią reakcje alergiczne, należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Nie stosować w przypadku urazów lub operacji w okolicy pochwy.
- Nie stosować podczas infekcji sromu i pochwy.
- Aby zapewnić higienę, produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Nie używać produktu uszkodzonego. Przed każdym zastosowaniem aplikator należy dokładnie sprawdzić pod kątem integralności. Nie używać aplikatora, jeśli jest uszkodzony (np. ma widoczne pęknięcia lub odpryski) lub jego tłok jest poluzowany i łatwo odłącza się od tuby.
- Wyrób ten nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.
- Żel nie jest środkiem plemnikobójczym ani nie wspomaga poczęcia. Nie ma działania antykoncepcyjnego i nie może być stosowany w celu zapobiegania ciąży.
- W pojedynczych przypadkach może wystąpić krótkotrwałe miejscowe pieczenie lub swędzenie, a także nieznaczne zwiększenie ilości wydzieliny z pochwy.
- Należy poinformować swojego lekarza, farmaceutę lub dystrybutora produktu, jeśli zauważysz skutki uboczne związane ze stosowaniem Ectifem żel. Jeśli objawy nie ustępują, pogarszają się lub pojawią się oznaki infekcji (jak wydzielina z pochwy o nietypowym kolorze / konsystencji / zapachu), należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie wszystkie składniki wypełniające ten preparat zostały dokładnie zbadane pod kątem bezpieczeństwa podczas ciąży i karmienia piersią. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży i karmienia piersią.
- Żel jest przeznaczony do codziennego stosowania. W przypadku problemów z samodzielną aplikacją preparatu należy skorzystać z pomocy osób trzecich.

#### Dodatkowe informacje

Ectifem żel jest kompatybilny z prezerwatywami z naturalnego lateksu, poliizoprenu i poliuretanu.