

# Eloprine 500 mg, 50 tabletek



Cena: 49,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	POLFARMEX S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

## Opis produktu

### Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

### Działanie

Przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

### Dawkowanie

- Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.
- Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę dobową należy podzielić na równe dawki pojedyncze, podawane kilka razy na dobę.
- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka dobową wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 8 tabletek (4 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku: zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.
- Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

### Skład

- Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę soli kwasu 4-acetamidobenzoowego z N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3). Jedna tabletkę zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.
- Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; objawami reakcji alergicznej mogą być:

wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

- Jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

#### Działania niepożądane

- Często (występują u 1 do 10 osób na 100): przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi; podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; bóle w nadbrzuszu; świąd skóry; wysypka skórna; bóle głowy; zawroty głowy; zmęczenie lub złe samopoczucie; bóle stawów.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna); zwiększona objętość moczu (wielomocz).

#### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować leku u dzieci w pierwszym roku życia.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.