

Eloprine Forte 500 mg/ 5ml, syrop, 150 ml



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Dawka | 500 mg/ 5ml |
| Opakowanie | 150 ml |
| Postać | syrop |
| Producent | POLFARMEX S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Inosinum pranobexum |

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Działanie

Substancja czynna inozyny pranobeks wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

Dawkowanie

- Podanie doustne.
 - Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę dobową należy podzielić na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.
 - Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml na 1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g (czyli 40 ml syropu) na dobę.
 - Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby; stosować zgodnie z poniższą tabelą.
- 10–14 kg 3 × 2,5 ml
 - 15–20 kg 3 × 2,5 do 3,5 ml
 - 21–30 kg 3 × 3,5 do 5 ml
 - 31–40 kg 3 × 5 do 7,5 ml
 - 41–50 kg 3 × 7,5 do 9 ml

Należy użyć załączoną do opakowania miarkę dozującą.

Skład

1 ml syropu zawiera 100 mg inozyiny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.
Jedna miarka (5 ml) syropu zawiera 500 mg inozyiny pranobeksu.

- Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 5 ml syropu zawiera: 3,25 g sacharozy; 5 mg metylu parahydroksybenzoesanu; 1,5 mg propylu parahydroksybenzoesanu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat truskawkowy płynny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Inozyiny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

Często (>1/100 do <1/10)

>1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu leczniczego przez okres 3 miesięcy lub dłużej:

- zaburzenia żołądka i jelit: nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu,
- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: podwyższenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub azotu moczniowego we krwi (BUN),
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: swędzenie, wysypka,
- zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie,
- zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów.

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

<1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu przez okres 3 miesięcy lub dłużej:

- zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, zaparcia,
- zaburzenia układu nerwowego: nerwowość, senność lub bezsenność,
- zaburzenia nerek i dróg moczowych: wielomocz (zwiększona objętość moczu).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.