

Emofix, maść hemostatyczna, 30 g



Cena: 33,24 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	D.M.G. DRUGS MINERALS AND GENERICS
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Emofix, maść hemostatyczna na krwawienia z nosa i z ran skórnych dla dzieci i dorosłych. Chroni i wzmacnia działanie naturalnych czynników krzepnięcia krwi. Szybko hamuje krwawienia z nosa o różnej etiologii oraz przyspiesza regenerację oraz ułatwia gojenie ran.

Zastosowanie

Zapobieganie i powstrzymanie epizodów krwawienia ze skóry i błon śluzowych, takich jak krwotok z nosa wywołany samoistnie lub spowodowany urazem, krwawienia z drobnych ran skórnych.

Sposób użycia

- Hamowanie krwawienia: krwawiące miejsce pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce.
- Zapobieganie nawrotom krwawienia: 2 razy dziennie, przez co najmniej dwa tygodnie po ostrym epizodzie krwawienia lub zgodnie z zaleceniami lekarz stosować maść.
- W przypadku stosowania na błonę śluzową nosa zaleca się użycie aplikatora dołączonego do opakowania. Po każdym użyciu oczyścić aplikator. Aplikator powinien być używany przez jedną osobę.

Skład

Mieszanka nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży, fosfatydylocholina, octan tokoferylu, wosk pszczeli, olej sojowy, alkohol stearylowy, chlorki wapnia, potasu i magnezu, monostearnian glicerolu, p-hydroksybenzoesan metylu i propylu, BHT.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 30°C.
- Podczas przechowywania w różnych temperaturach konsystencja maści może się zmieniać, nie powodując pogorszenia jej jakości. Po umieszczeniu w temperaturze pokojowej maść odzyskuje właściwą konsystencję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądej należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Pieczenie, swędzenie w nosie i wyciek z nosa mogą pojawić się w pierwszych dniach leczenia i zwykle ustępują w trakcie terapii. Jeśli objawy te utrzymują się, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.
- Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
- Po użyciu tubę mocno zakręcić.