Espumisan 100 mg/ ml, przeciw wzdęciom, krople doustne, 30 ml

Cena: 26,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	0,1 g/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	krople doustne, emulsja
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Simeticonum

Opis produktu

Opis
Espumisan 100 mg/ ml, krople doustne wskazane do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w zaburzeniach przewodu pokarmowego.

Wskazania

- Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym.
- Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Działanie
Zmniejszenie powierzchownego napięcia pęcherzyków gazu występujących w masach pokarmowych i śluzie układu trawiennego.

Dawkowanie

- Niemowlęta: 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią.
- Dzieci w wieku 1-6. lat: 10 kropli od 3 do 5 razy na dobę.
- Dzieci od 6-14. lat: 10-20 kropli od 3 do 5 razy na dobę.
- Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 14. roku życia: 20 kropli od 3 do 5 razy na dobę.

Skład
1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu Sorbitol (E420), 139 mg/ml

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.