

Faringosept 10 mg, smak kakaowy, 20 tabletek do ssania



Cena: 14,07 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Dawka | 10 mg |
| Opakowanie | 20 tabletek do ssania |
| Postać | tabletki do ssania |
| Producent | RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Ambazonum |

Opis produktu

Wskazania

Pomocniczo w ostrych zakażeniach jamy ustnej i gardła przy: zapaleniu migdałków, zapaleniu dziąseł, zapaleniu jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków i po ekstrakcji zębów.

Działanie

Lek odkażający stosowany w zakażeniach jamy ustnej i gardła. Wykazuje działanie bakteriostatyczne (hamuje rozwój bakterii) na niektóre rodzaje bakterii, jak paciorkowce (hemolizujące, zieleniące) i pneumokoki.

Dawkowanie

- Ssać powoli 3 do 5 tabletek na dobę przez 3 do 4 dni.
- Tabletek nie należy połykać, ale pozwolić, aby powoli rozpuściły się w jamie ustnej.
- Przyjmować w niedługim czasie po jedzeniu (15-30 minut), nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po zażyciu leku.

Skład

Substancją czynną leku jest ambazon (w postaci ambazonu jednowodnego).
Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, kakao, powidon K30, kwas stearynowy, wanilina.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, jednak przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
- Nie przekraczać zalecanego dawkowania. Jeżeli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.