

Femannose N, proszek, 14 saszetek



Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	14 saszetek
Postać	proszek
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 14 roku życia

Opis produktu

Opis

Femannose N, proszek w saszetkach, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia. Zawiera D-mannozę, która stanowi główny składnik produktu, który uniemożliwia przyleganie drobnoustrojów wnikających do układu moczowo-płciowego do nabłonka dróg moczowych, dzięki czemu zostają one wydalone wraz z moczem. Dodatkowo produkt łagodzi objawy infekcji dróg moczowych takie jak: pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na mocz.

Zastosowanie

Profilaktyka i wspomaganie w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego oraz bakteryjnych infekcji dolnych dróg moczowych.

Zalecane spożycie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: leczenie wspomagające ostrego zapalenia pęcherza moczowego (cystitis): od 1. do 3. dnia: 3 saszetki dziennie, 4. i 5. dzień: 2 saszetki dziennie. Profilaktyka zapalenia pęcherza moczowego (cystitis): 1 saszetka dziennie.
- Zawartość saszetki rozpuścić w wodzie poprzez mieszanie. Aby zapobiec nawrotom infekcji zalecane jest stosowanie wyrobu przez 30 dni, najlepiej wieczorem.

Skład

Substancja czynna: D-mannoza (2 g na saszetkę)

Substancje pomocnicze: substancje słodzące (fruktoza, sacharoza), kwas cytrynowy, barwnik (burak), środek antyadhezyjny (dwutlenek krzemu), aromat.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub nietolerancji na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego.

- Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
- Kobiety ciężarne i w okresie karmienia piersią przez użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Wyrób medyczny Femannose N działa synergistycznie (wspomaga działanie) w stosunku do antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji dróg moczowo-płciowych.

Wszelkie leki i suplementy diety należy przyjmować 2 godziny przed lub po podaniu Femannose N.