

Fibrotin, 30 kapsułek



Cena: 16,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent	SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.
Rejestracja	Suplement diety
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Opis

Fibrotin, suplement diety w postaci kapsułek, przeznaczony dla osób dorosłych.

- Witamina D wspomaga układ mięśniowo-szkieletowy, wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz utrzymanie zdrowych kości, pomaga we wchłanianiu wapnia i fosforu. Wspomaga także prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
- Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi.
- Witamina B6, B12 wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
- Witaminy B6, B12 i kwas foliowy wspomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny i funkcji psychologicznych, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomagają poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie

Produkt stosowany jest w celu: wsparcia prawidłowego funkcjonowania kości i mięśni, uzupełnienia niedoborów witamin D, B6, B12 oraz kwasu foliowego, regulacji metabolizmu homocysteiny, prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz znużenia.

Zalecane spożycie

- Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.
- Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Skład

Olej sojowy (całkowicie rafinowany), składnik otoczki kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (składnik otoczki kapsułki): glicerol; witamina B12 (cyjanokobalamina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), emulgator: dwutlenek krzemu; witamina D (cholekalcyferol); barwnik (składnik otoczki kapsułki): dwutlenek tytanu; kwas foliowy: (kwas pteroilomonoglutaminowy); barwniki (składniki otoczki kapsułki): tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera: Witamina D 50 µg (2000 j.m.) (1000%)*, Witamina B6 6 mg (429%)*, Witamina B12 10 µg (400%)*, Kwas foliowy 400 µg (200%)*

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej – do 25°C, w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie zaleca się stosowanie przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Dodatkowe informacje

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.