

Flegamax Forte, dla młodzieży 12+, 2,7 g x 6 saszetek

Cena: 27,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	2700 mg/saszetkę
Opakowanie	6 saszetek
Postać	granulat do sporządzania roztworu doustnego
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

W objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Karbocysteina powoduje, że wydzielina jest bardziej płynna. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie z dróg oddechowych podczas kaszlu.

Dawkowanie

- Lek podawać doustnie.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszетка raz na dobę (2700 mg karbocysteiny z lizyną).
- Zawartość jednej saszетки rozpuścić w pół szklanki wody, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie wypić. Tak przygotowany roztwór należy przyjąć bezpośrednio po sporządzeniu.
- Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni.
- Podczas leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.
- Nie należy stosować leku przed snem. Dawkę leku należy przyjąć nie później niż 4 godziny przed snem.

Skład

Substancją czynną leku jest karbocysteina z lizyną. Każda saszетка zawiera 2700 mg karbocysteiny z lizyną, co odpowiada 1500 mg karbocysteiny.

- Pozostałe składniki to: aspartam (E 951), mannitol, kwas cytrynowy bezwodny, powidon K30, aromat pomarańczowy (maltodekstryna kukurydziana, guma arabska, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol (E 320)).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na karbocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- W stanie astmatycznym,
- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów (częstość nieznaną), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna) z obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów;
- zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych).

Inne działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- ból głowy;
- ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty;
- skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, wysypka polekowa.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa; w przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania

konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

- Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W razie wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.
- Podczas stosowania leku Flegamax Forte nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.
- Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.
- Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.
- Lek zawiera 30 mg aspartamu w każdej saszetce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.