

Flegatussin Caps 8 mg, 20 kapsułek miękkih

Cena: 9,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	8 mg
Opakowanie	20 kapsułek miękkih
Postać	kapsułki miękkie
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Bromhexinum

Opis produktu

Opis

Flegatussin Caps, lek w postaci kapsułek miękkih. Przeznaczony dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych i działa wykrztuśnie.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnionym wykrztuszaniem gęstej wydzieliny.

Działanie

Ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.
- Podawać doustnie.
- Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
- Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów podczas leczenia.
- Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.
- Jeśli objawy nie ustąpią po 4-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. Każda kapsułka zawiera 8 mg bromoheksyny chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to: wypełnienie kapsułki: makrogol 600, sodu wodorotlenek, kwas askorbowy (E 300), woda oczyszczona; otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E 420), błękit patentowy V (E 131), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na bromoheksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów): nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka, gorączka.
- Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, uogólniona osutka krostkowa), bóle głowy, zawroty głowy, senność, zmniejszenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, niestrawność, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania leku, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
- Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegatussin Caps należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: u pacjenta występuje choroba zwana dyskinezą rzęsek z zaburzoną czynnością motoryczną oskrzeli; u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek; pacjent ma trudności z odkrztuszaniem lub ma astmę; u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; u pacjenta wystąpi duszność, gorączka i ropna plwocina.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.