

Galvenox Veno 500 mg, 30 kapsułek twardych

Cena: 26,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	30 kapsułek twardych
Postać	kapsułki twarde
Producent	FARMACEUTYCZNA SP. PRACY "GALENA"
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Calcii dobesilas

Opis produktu

Wskazania

- Objawy przewlekłej niewydolności żylnych kończyn dolnych: bóle, kurcze, uczucie ciężkości nóg, mrowienie, drętwienie kończyn dolnych, zmiany skórne związane z zastojem żylnym, żylaki kończyn dolnych, obrzęki związane z przewlekłą niewydolnością żylną.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie

- Działa na ściany naczyń włosowatych. Zmniejsza ich nadmierną przepuszczalność i łamliwość, zwiększa ich wytrzymałość, dzięki czemu zapobiega przesiąkaniu płynów przez ściany naczyń.
- Przyspiesza syntezę kolagenu, który stanowi ważny składnik strukturalny ścian tętnic.
- Zmniejsza lepkość krwi, zwiększa elastyczność erytrocytów, a także wykazuje działanie przeciwapagacyjne. Powoduje to usprawnienie obwodowego krążenia żylnego, zmniejszenie zastój w naczyniach żylnych i hamowanie rozwoju zmian zakrzepowych, które towarzyszą powstawaniu żylaków.
- Zmniejsza także przepuszczalność i łamliwość naczyń limfatycznych oraz poprawia drenaż limfatyczny, powodując zmniejszenie obrzęków.

Dawkowanie

- Dorośli : zwykle od 1 do 2 kapsułek na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg wapnia dobezylanu jednowodnego).
- Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.
- Stosować doustnie, w trakcie głównych posiłków.

Skład

- Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), azorubina (E 122), żółcień

chinolinowa (E 104), żelatyna.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Nie stosować u dzieci.

Działania niepożądane

- Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób): ból w nadbrzuszu, nudności, biegunki, wymioty, reakcje skórne, bóle stawów, bóle i zawroty głowy, gorączka.
- Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób): zahamowanie czynności szpiku z agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
- Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30oC. W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.