

# GardloX Med, smak pomarańczowo- miodowy, 16 pastylek do ssania



Cena: 12,51 zł

## Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	16 pastylek do ssania
Postać	pastylki twarde
Producent	S-LAB SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

GardloX Med to lek stosowany przy miejscowym ostrym bólu gardła u dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

### Działanie

Lek GardloX Med zawiera jako substancję czynną Benzydaminu chlorowodorek, który charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1 pastylka 3 razy dziennie.

Pastylka powinna się powoli rozpuścić w ustach, nie należy jej połykać ani rozgryzać.

### Skład

Każda pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodoru (co odpowiada 2,68 mg benzydaminu).

Substancje pomocnicze: izomalt (E 953), kwas cytrynowy jednowodny, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), aromat miodowy, aromat pomarańczowy, olejek eteryczny miętowy, czerwieni koszenilowej (E 124).

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Benzydaminu nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy oraz kwas salicylowy) lub inne NLPZ.
- U pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku astmy oskrzelowej może wystąpić skurcz oskrzeli. U tych pacjentów należy zachować ostrożność.
- U niewielkiej grupy pacjentów poważny proces chorobowy może spowodować powstanie owrzodzeń na policzkach/w gardle.

Jeśli objawy ulegną nasileniu, nie zmniejszają się lub utrzymują przez ponad 3 dni, jeśli wystąpi gorączka lub inne objawy, stan kliniczny pacjenta musi ocenić lekarz.

- Długotrwałe stosowanie może spowodować reakcje alergiczne. W przypadku ich wystąpienia stosowanie produktu należy przerwać i skonsultować się z lekarzem odnośnie odpowiedniej terapii.
- Ten produkt leczniczy zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.
- Ten produkt leczniczy zawiera izomalt. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera czerwień koszenilową, barwnik, który może powodować reakcje alergiczne (dotyczy: Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy)

#### **Działania niepożądane**

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

#### **Przechowywanie**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

W przypadku, gdy objawy utrzymują się ponad 3 dni lub towarzyszy im wysoka gorączka, należy ocenić stan kliniczny chorego.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.