

Gastrovit MultiActive 4,55g/5ml, na niestrawność, płyn doustny, 100 ml



Cena: 12,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Dawka	4,55 g/5ml
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt ziołowy
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Artecholin N, złożony lek roślinny w postaci płynu doustnego. Substancją czynną leku stanowi płynny wyciąg alkoholowo-wodny złożony z: ziela bylicy boże drzewko, owocu ostropestu plamistego, liścia mięty pieprzowej, ziela drapacza lekarskiego, korzenia mniszka lekarskiego i ziela krwawnika. Lek można stosować u młodzieży od 12 lat.

Wskazania

Do tradycyjnego stosowania w niestrawnościach (z objawami zgagi, odbijania, nudności) i zaburzeniach żołądkowo-jelitowych spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem soku żołądkowego i żółci.

Działanie

Wspomagające trawienie.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 12 lat: przyjmować do 3 razy dziennie przed lub w czasie posiłku po 5 ml preparatu rozcieńczonego w niewielkiej ilości płynu (chyba, że lekarz zaleci inaczej).
- Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek przeznaczony jest do doraźnego stosowania.

Skład

100 ml płynu zawiera 100 ml wyciągu złożonego płynnego (0,67:1) z: ziela bylicy boże drzewko (*Artemisiae abrotani herba*), owocu ostropestu plamistego (*Silybi mariani fructu*), liścia mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folio*), ziela drapacza lekarskiego (*Cnici benedicti*)

herba), korzenia mniszka lekarskiego (*Taraxaci radice*), ziela krwawnika (*Millefolii herba*) (35/15/8/3/3/3), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Lek zawiera 60-70% (V/V) etanolu.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na którykolwiek składnik produktu,
- Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*, dawniej *Compositae*) np. krwawnik, rumianek, arnikę,
- Uczulenie na mentol,
- Zapalenie dróg żółciowych,
- Kamienie żółciowe i inne schorzenia dróg żółciowych,
- Zapalenie wątroby,
- Czynna choroba wrzodowa i refluks żołądkowo-jelitowy.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera 2,95 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina lub 70 ml piwa. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- Inne leki i Artecholin N: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.
- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji oraz wpływu na płodność. Przed użyciem

preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

- Dzieci i młodzież: lek można stosować u młodzieży od 12 lat.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek ten zawiera 60 - 70% objętościowych etanolu tj. 2,95 g etanolu w pojedynczej dawce (5 ml), co stanowi odpowiednik ok. 30 ml wina i ok. 70 ml piwa. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu, ponieważ produkt może upośledzać sprawność psychofizyczną. Po zastosowaniu leku, alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące jego poziom w powietrzu wydychanym.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.