

Gelatum Aluminium Phosphorici, zawiesina doustna, 250 g



Cena: 8,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	250 g
Dawka	45 mg/g
Opakowanie	250 g
Postać	zawiesina doustna
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aluminium phosphate

Opis produktu

Wskazania

Leczenie wspomagające objawów nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu: choroby refluksowej przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie

- Podanie doustne.
- Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.
- Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami od 5 ml do 15 ml, 3 do 5 razy na dobę.
- Na noc zaleca się przyjąć podwójną dawkę. Maksymalna dawka dobową nie powinna być większa niż 100 ml.
- Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.

Skład

100 g produktu zawiera substancję czynną 4,5 g glinu fosforan żel (Aluminium phosphatis liquamen) oraz substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoosan, olejek z obniżoną zawartością mentolu, sodu wodorowęglan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na fosforan glinu lub substancje pomocnicze.
- Przewlekła niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów dializowanych.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: zaparcia, zwiększenie stężenia glinu we krwi, obniżenie stężenia fosforanów (hipofosfatemia) objawiające się: brakiem łaknienia, złym samopoczuciem, osłabieniem mięśni, rozmiękaniem kości; zaburzenia czynności nerek, encefalopatia (uszkodzenie mózgu objawiające się zaburzeniami zachowania), reakcje nadwrażliwości.

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu leku: 28 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zmniejsza działanie poniżej wymienionych leków:

- tetracykliny (lek należy przyjmować 3 do 4 godzin po ich przyjęciu);
 - ciprofloksacyny, norfloksacyny (leki przeciwbakteryjne);
 - fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki);
 - związków żelaza;
 - glikozydów nasercowych (stosowane w chorobach serca);
 - ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy);
 - salicylanów;
 - chinidyny (lek przeciwaritmiczny);
 - lewotyrosyny (lek stosowany w niedoczynności tarczycy);
 - antagonistów receptorów H₂ (cymetydyny, ranitydyny, famotydyny);
 - sukralfatu (stosowany w chorobie wrzodowej).
- Lek może zmieniać miejsce działania leków w postaci tabletek dojelitowych (zamiast w jelitach specjalna otoczka leku rozpuszcza się w żołądku). Dlatego leki te należy przyjmować na 1 godzinę przed lub 1 godzinę po zażyciu leku.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

- Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy skontaktować z lekarzem.
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: nie wywiera wpływu.
- Środki ostrożności związane ze stosowaniem: leku nie należy stosować bez porozumienia z lekarzem: u dzieci poniżej 6 lat, osób ze schorzeniami układu kostnego, z zaburzeniami czynności nerek oraz u chorych na chorobę Alzheimera.
- Nie należy stosować leku długotrwale. Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera sacharozę. 15 ml zawiesiny zawiera 7,350 g sacharozy.
- Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.