

Gerdoff, na refluks, bez laktozy, 20 tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej



Cena: 52,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej
Postać	tabletki rozpuszczalne w jamie ustnej
Producent	VITAMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Gerdoff, wyrób medyczny w postaci tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej o miejscowym działaniu. Tabletki rozpuszczają się w jamie ustnej, stymulując wydzielanie śliny i zapewniają lepszy kontakt między składnikami, a ścianą przełyku, co zwiększa ochronę i nawilżenie. Tabletki o mlecznym smaku. Przeznaczone do leczenia kwaśnego i niekwaśnego refluksu żołądkowo-przełykowy oraz ochrony przełyku. Szybko zmniejsza objawy związane z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Zastosowanie

Gerdoff o działaniu miejscowym wskazanym do stosowania w:

- leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku.
- objawowym leczeniu nadkwasoty (sporadyczny ból i pieczenie w żołądku).

Zalecane spożycie

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1-2 tabletki po posiłku i/lub przed snem lub w razie potrzeby w przypadku wystąpienia takich objawów jak bóle i przeczenie żołądka, zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Dzieci powyżej 6. lat: stosować po konsultacji z lekarzem. 1 tabletkę po głównych posiłkach i/lub przed snem lub w przypadku wystąpienia objawów takich jak bóle i pieczenie żołądka. W razie konieczności tabletkę można podzielić na pół.

Skład

Sól sodowa siarczanu chondroityny, sacharoza, wodorotlenek glinu, węglan wapnia, substancje przeciwzbrylające: mono-, di- i trójglicerydy kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, hialuronian sodu o dużej masie cząsteczkowej; aromat; substancja słodząca: glicyryzyny amonu.

Przechowywanie

- Z dala od źródła ciepła, w suchym miejscu.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku niewydolności nerek, hipofosfatemii lub nadwrażliwości na składnik preparatu.
- Ciąża i karmienie piersią: stosowanie po konsultacji z lekarzem.
- Produkt zawiera wodorotlenek glinu, który może zakłócać wchłanianie leków. Cytryniany mogą zwiększać wchłanianie glinu. W przypadku zażywania leków należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego wyrobu. Nie przyjmuj leków 1 godzinę przed i 2 godziny po zażyciu produktu.

Dodatkowe informacje

- Produkt nie zawiera glutenu, laktozy i pochodnych mleka.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.