

## Ginkofar Extra 240 mg, 30 tabletek powlekanych



Cena: 44,90 zł

### Opis słownikowy

Dawka	240 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ginkgo bilobae extractum

### Opis produktu

#### Opis

Ginkofar Extra, lek w postaci tabletek powlekanych zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

#### Wskazania

- W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),
- W celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

#### Działanie

Poprawa przepływu krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

#### Dawkowanie

- Dorośli : 1 tabletkę raz na dobę.
- Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni.
- Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

#### Skład

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego.

Każda tabletkę powlekana zawiera 240 mg kwantyfikowanego suchego wyciągu z liści miłorzębu (*Ginkgo biloba* L., folium) (35 - 67 : 1), co odpowiada: 52,8 do 64,8 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, 6,72 do 8,16 mg ginkgolidów A, B i C, 6,24 do 7,68 mg bilobalidu.

Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 65% v/v.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E172), talk.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Okres ciąży.

## Działania niepożądane

- Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10): ból głowy.
- Często (u 1 do 10 osób na 100): zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych). Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rozrzedzających krew (przeciwwązkrzepowych i przeciwplatektykowych). Reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny), alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwplatektywne (tzw. leki rozrzedzające krew), powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
- Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku.
- Zaleca się przerwać stosowanie leku przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wrywanie zęba.
- Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych napadów podczas przyjmowania leku Ginkofar Extra.
- Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.
- W przypadku objawów uczulenia należy przerwać stosowanie leku.
- W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.