

Ginkofar Intense 120 mg, 30 tabletek powlekanych



Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	120 mg
Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ginkgo bilobae extractum

Opis produktu

Wskazania

- W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),
- W celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Działanie

Wyciąg z liści mitorzębu japońskiego poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

Dawkowanie

- Zalecana dawka u dorosłych wynosi 2 tabletki na dobę (jedna tabletko rano i jedna wieczorem), przyjmować doustnie,
- Połknąć, popijając wodą, można przyjmować niezależnie od posiłków,
- Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni. Jeśli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona.

Skład

Każda tabletko powlekana zawiera: 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum – kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liśćmińrzębu) (35 - 67 : 1), co odpowiada: •26,4 do 32,4 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, •3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C, •3,12 do 3,84 mg bilobalidu, Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 65% (v/v).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 30 mg.

Rdzeń tabletki: krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczkę tabletki: tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E172), talk, alkohol poliwinylowy.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży,
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
- Okres ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

- Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10): ból głowy.
- Często (u 1 do 10 osób na 100): zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych), ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych i przeciwplatekcyjnych). Reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny), alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci,
- W oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.