

Ginkoflav med 80 mg, 60 kapsułek

Cena: 23,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	kapsułki twarde
Producent	OLIMP LABORATORIES
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ginkgo biloba

Opis produktu

Opis

Ginkoflav Medto lek który zawiera 80 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wskazania

Ginkoflav Med 80 mg to lek stosowany w celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane z wiekiem), a także pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu.

Działanie

Lek Ginkoflav Med zawiera suchy wyciąg kwantyfikowany z liści miłorzębu japońskiego, który rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi w mózgu i zmniejsza agregację płytek krwi.

Dawkowanie

- Zalecana dawka u dorosłych i osób w podeszłym wieku to po 1 kapsułce 3 razy na dobę.
- Kapsułkę należy popić płynem.
- Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni.
- Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Po 3 miesiącach należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować terapię.

Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Każda kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L., folium (35- 67:1), odpowiadającego: 17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C; 2,1-2,6 mg bilobalidu.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 65% (v/v)

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, otoczka kapsułki (żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona).

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liści miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Nie stosować w czasie ciąży

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.