

Groprinosin Forte 1000 mg, 30 tabletek



Cena: 46,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Dawka | 1000 mg |
| Opakowanie | 30 tabletek |
| Postać | tabletki |
| Producent | GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Inosinum pranobexum |
| Wiek | od 1 roku życia |

Opis produktu

Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Groprinosin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Działanie

- Przeciwwirusowe.
- Wspomagające odporność.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka dobową wynosi 3 tabletki (3 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 3 razy na dobę).
- Maksymalna dawka dobową to 4 tabletki (4 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 4 razy na dobę).
- Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 5 do 14 dni.

Po ustąpieniu objawów stosowanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Skład

Substancja czynna: inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoosan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

1 tabletkę zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na inozylny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
- Nie należy stosować u dzieci w 1. roku życia.
- Ciąża i okres karmienia piersią - po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.