

Gynauxil, 10 globulek dopochwowych



Cena: 35,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 globulek dopochwowych
Postać	globulki dopochwowe
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Gynauxil, wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych dla kobiet w każdym wieku. Pałeczki kwasu mlekowego *Lactobacillus*, stanowią jedyną florę bakteryjną pochwy, które produkują kwas mlekowy jako końcowy produkt metabolizmu węglowodanów i zakwaszają środowisko pochwy. Bakterie te w warunkach fizjologicznych utrzymują odpowiednio niskie pH pochwy na poziomie 3,5-4,5, stymulują układ odpornościowy oraz hamują namnażanie bakterii chorobotwórczych. Gynauxil zawiera składniki podłoża umożliwiające selektywne namnażanie bakterii *Lactobacillus Vaginalis*.

Zastosowanie

- Przywracanie lub utrzymanie właściwego pH, co stwarza warunki hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
- Łagodzenie objawów suchości pochwy, wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, po menstruacji, w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu pochwy.
- Przeciwdziałanie stanom atrofii błony śluzowej pochwy.

Sposób użycia

- Kobiety miesiączkujące / w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować.
- Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań lekarza. Należy zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.

Skład

Glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksyłowany alkohol cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

Dodatkowe informacje

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.