Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

Hasceral (100 mg + 50 mg)/ g, maść, 50 g

Cena: 20,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 g
Dawka	(100 mg + 50 mg)/ g
Opakowanie	50 g
Postać	maść
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Urea, Acidum salicylicum

Opis produktu

Wskazania
Alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej etiologii.
Choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia:

- Rybia łuska, łuszczyca,
- Łupież czerwony mieszkowy,
- Nadmierne rogowacenie dłoni i stóp,
- Rogowacenie mieszkowe.

Działanie
Mocznik wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do złuszczania warstwy rogowej naskórka. Wpływa także na rozmiękczanie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a także odnawia płaszcz ochronny skóry, co w znaczącym stopniu ogranicza zwrotną utratę wody przez powłoki skórne. Kwas salicylowy w stężeniu 5 % wywołuje złuszczanie komórek naskórka.

Dawkowanie

- Stosować na skórę.
- Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dobę.
- Stosować przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy.
- Lek zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść.

Skład
Substancjami czynnymi leku są mocznik i kwas salicylowy.
1 g maści zawiera 100 mg mocznika i 50 mg kwasu salicylowego.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian, Simulsol 165, glicerol, wazelina biała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
Niekiedy może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

Przechowywanie

- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.