

Hasco Syrop prawoślazowy 35,9 g/100 g, 125 g



Cena: 6,50 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Althaeae sirupus
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Podrażnienie błony śluzowej górnych dróg oddechowych i towarzyszącego im kaszlu.

Działanie

Łagodzące na podrażnienia błony śluzowej wynikające z kaszlu.

Dawkowanie

- Lek do stosowania doustnego.
- Dorośli: 1 łyżkę 3 razy dziennie.

Skład

100 g syropu zawiera 35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L., radix) (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu) Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy. Zawartość etanolu (760g/l) w produkcie wynosi nie więcej niż 1,1% (m/v).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Przechowywanie

- W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na lek, należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie. Jeśli znana jest jakakolwiek alergia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników produktu leczniczego, nie wolno go stosować.
- Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku – lek zawiera sacharozę.
- Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
- W okresie ciąży oraz karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku.
- Ze względu na zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci do 6. roku życia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.