

Hascovir Pro 50 mg/ g, krem, 5 g



Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	5 g
Dawka	50 mg/ g
Opakowanie	5 g
Postać	krem
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aciclovirum

Opis produktu

Wskazania

Leczenie opryszczki wargowej (tzw. zimno) i zmian opryszczkowych twarzy.

Działanie

Substancja czynna acyldowir po zastosowaniu na skórę wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie

- Stosować miejscowo na skórę.
- Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.
- Należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku.
- Leczenie powinno trwać 5 dni.

Skład

1 g żelu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

- Często (występują u 1 do 10 osób na 100): łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia; swędzenie.
- Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): rumień; kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie Jak obrzęk naczynioruchowy.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.