


# Hederasal Max, 20 tabletek



Cena: 15,21 zł

## Opis słownikowy

Dawka	52,5 mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hedera helix

## Opis produktu

### Opis

Hederasal Max jest lekiem roślinnym, zawiera 52,5 mg wyciągu suchego z liścia bluszczu (*Hederae helicis folii extractum siccum*), stosowanym jako środek wykrztuśny.

Saponiny zawarte w wyciągu z bluszczu wykazują działanie przeciwzapalne, rozkurczają mięśnie gładkie oskrzeli oraz zmniejszają częstotliwość ataków kaszlu. Posiadają również zdolność upłynniania gęstego śluzu, często zalegającego w drogach oddechowych w przebiegu stanów zapalnych.

### Wskazania

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

### Działanie

Hederasal MAX zmniejsza częstotliwość oraz bolesność ataków kaszlu.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę.
- Stosować doustnie, popić wodą. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

### Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z liścia bluszczu (*Hederae helicis folii extractum siccum*). Jedna tabletkę zawiera 52,5 mg wyciągu suchego z *Hedera helix* L., folium (liść bluszczu) (DER pierwotny 4-8:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m). Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokryształiczna (typ 102), kroscarmeloza sodowa, olejek eteryczny anyżowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

### Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (wyciąg suchy z liści bluszczu) i rośliny z rodziny araliowatych (*Araliaceae*) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

**Działania niepożądane**

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Hederasal MAX mogą wystąpić:

- Zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, biegunka) – częstość nieznana.
- Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, duszności, reakcja anafilaktyczna) – częstość nieznana.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z nieżytem lub chorobą wrzodową żołądka.
- Jeśli po upływie tygodnia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.