

Heel Engystol, 50 tabletek



Cena: 36,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

Działanie

Łagodzi objawy infekcji i skraca czas jej trwania.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy dziennie, dawki maksymalne: 1 tabletkę do 12 razy dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletkę 2 razy dziennie, dawki maksymalne: 1 tabletkę do 8 razy dziennie.
- Dzieci od 4 do 5 lat: 0,5-1 tabletkę 1-2 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem, dawki maksymalne 0,5-1 tabletkę do 4 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.
- Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach. Dzieciom poniżej 6 lat zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody. Dzieci od 4 do 5 lat mogą przyjmować połowę tabletki. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.
- Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

Substancjami czynnymi w 1 tabletkę leku Engystol są: 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D6, 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D10, 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D30, 37,5 mg Sulfur D4, 37,5 mg Sulfur D10.

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić: przejściowe reakcje ze strony skóry (np. wysypka, świąd, rumień), dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. ból brzucha, uczucie dyskomfortu). Częstotliwość występowania tych dolegliwości nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 3 lat.
- U dzieci w wieku 4-6 lat produkt może być stosowany po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
- Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.