

Heel Traumeel S, maść, 50 g



Cena: 32,35 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 g
Opakowanie	50 g
Postać	maść
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco po urazach takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

Działanie

Łagodzące dolegliwości bólowe mięśni i stawów.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: rano i wieczorem nanosić na chore miejsca i wcierać.
- Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład

100 g maści zawiera: Substancjami czynnymi leku są: 1,5 g Arnica montana D3, 0,45 g Calendula officinalis TM, 0,45 g Hamamelis virginiana TM, 0,15 g Echinacea TM, 0,15 g Echinacea purpurea TM, 0,15 g Chamomilla recutita TM, 0,1 g Symphytum officinale D4, 0,1 g Bellis perennis TM, 0,09 g Hypericum perforatum D6, 0,09 g Achillea millefolium TM, 0,05 g Aconitum napellus D1, 0,05 g Atropa belladonna D1, 0,04 g Mercurius solubilis Hahnemanni D6, 0,025 g Hepar sulfuris D6.

Pozostałe składniki to: emulgowany alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona, etanol.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku.
- Nadwrażliwość na arnikę (Arnica montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae)

dawniej złożonych (Compositae).

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (zapalenie skóry, zaczerwienienie, obrzęk i świąd). Należy wtedy zaprzestać stosowania leku.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Alkohol cetostearylowy może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem u młodzieży poniżej 18 lat zalecana jest konsultacja z lekarzem.
- Nie stosować maści na duże powierzchnie skóry ani bezpośrednio na otwarte rany, skórę uszkodzoną (zranioną).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.