

Heel Vomitusheel, krople doustne, roztwór, 30 ml



Cena: 37,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	krople doustne, roztwór
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Homeopatyczny produkt leczniczy
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco w nudnościach.

Działanie

Łagodzące nudności.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.
- Krople można zmieszać z niewielką ilością wody, przyjmować pomiędzy posiłkami.

Skład

Substancjami czynnymi w 100 g roztworu Vomitusheel są: 10 g Psychotria ipecacuanha D4, 10 g Aethusa cynapium D4, 10 g Strychnos nux-vomica D4, 15 g Apomorphinum hydrochloricum D6, 25 g Colchicum autumnale D6, 30 g Strychnos ignatii D6. Pozostałe składniki to: lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku,
- Okres ciąży.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.
- Jeżeli wymienionym objawom towarzyszy gorączka i/lub dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, niedawno miało miejsce zranienie lub jeżeli objawy pogorszą się lub nie ustąpią w ciągu 24 godzin, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.
- Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,3 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.
- Nie przekraczać zalecanej dawki.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.