Hemorol, 12 czopków

Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	12 czopków doodbytniczych
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony

Opis produktu

Opis
Lek Hemorol w postaci czopków doodbytniczych, stosowany tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu oraz w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu.

Wskazania

- Tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu.
- Przewlekłe stany zapalne błony śluzowej odbytu oraz podrażnienia i pęknięcia śluzówki odbytu.

Działanie

- Ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy.
- Miejscowo działają ściągająco, przeciwzapalnie, rozkurczająco.

Dawkowanie

- Dorośli: rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra wprowadzić doodbytniczo 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia.
- Stosować do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni.

Skład
Substancjami czynnymi w jednym czopku (2 g) są: wyciąg gęsty (3:1) z koszyczka rumianku – 50 mg (ekstrahent: woda oczyszczona), wyciąg gęsty (4:1) z korzenia pokrzyku – 20 mg (ekstrahent: etanol 70% V/V), benzokaina – 100 mg, wyciąg gęsty złożony (4:1) z: ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika – 80 mg (ekstrahent: etanol 40% V/V).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Iczulenie na benzokainę lub na rośliny z rodziny Asteraceae dawniej Compositae (złożone).

- Choroba nowotworowa jelita grubego,
- Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Przechowywanie

- W temperaturze powyżej 25°C,
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.