

Heviran Comfort krem 50 mg/g, 2 g



Cena: 11,61 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	2 g
Dawka	50 mg/g
Opakowanie	2 g
Postać	krem
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aciclovirum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Lek Heviran Comfort jest lekiem w postaci kremu do stosowania na skórę. Zawiera substancję czynną acyklowir, który działa przeciwwirusowo, wykazuje silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Lek Heviran Comfort krem jest wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg (tzw. zimno) i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

Wskazania

Lek Heviran Comfort krem jest wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg (tzw. zimno) i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.

Dawkowanie

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat: należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir. Każdy gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki to: alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy (E 1520), sodu laurylosiarczan, poloksamer 407, wazelina biała, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Niezbyt często (występują u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry,
- przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia może pojawić się bezpośrednio po nałożeniu kremu,
- swędzenie.

Rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

- rumień,
- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu kremu z acyklowirem.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna - obrzęk może obejmować okolice rąk i nóg, twarz, wargi, język, gardłoi powodować trudności w oddychaniu) i pokrzywka (objawy to swędzące pęcherze i rumień na skórze).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować kremu:

- na zakażenia skórne inne niż opryszczka;
- do leczenia opryszczki narządów płciowych;
- na błony śluzowe (np. oczu, wewnątrz jamy ustnej lub nosa).

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.