Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

HiPP ORS 200, kleik marchwiowo-ryżowy po 4. miesiącu, 200 ml

Cena: 9,93 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	200 ml
Opakowanie	200 ml
Postać	płyn
Producent	HIPP SP. Z O.O.
Rejestracja	Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu

Opis
Kleik marchwiowo-ryżowy, to przygotowany z naturalnych składników, gotowy do spożycia doustny płyn nawadniający o specjalnej kompozycji składników odżywczych i mineralnych, dostosowanej do regulacji zaburzonej równowagi wodno-elektrolitowej. Płyn dla niemowląt po 4. miesiącu życia.

Zastosowanie
Do postępowania dietetycznego podczas biegunki jako element zróżnicowanej diety uzupełniającej. Dla niemowląt po 4. miesiącu - stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Zalecane spożycie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, w początkowych 3 - 4 godzinach biegunki podawać wyłącznie HiPP ORS 200:

- przy lekkiej biegunce (utrata masy ciała do 3 %) - 20-30 ml/kg masy ciała
- przy średniej biegunce (utrata masy ciała 3-8%) - 30-80 ml/kg masy ciała.

Po skutecznym nawodnieniu należy jak najszybciej rozpocząć wprowadzanie zwyczajowych produktów i powrócić do wcześniejszej diety (zgodnie z instrukcją podaną na wewnętrznej stronie etykiety).
Dalsza utrata płynów powinna być wyrównana dodatkową porcją 50-100 ml HiPP ORS 200 po każdym oddaniu płynnego stolca i/lub wymiotach (płyn najlepiej podawać łyżeczką, w małych odstępach czasu, np. co 5-10 min).

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Przed podaniem schłodzić.
- Potrzebną porcję przelać do osobnego naczynia. Pozostałą zawartość butelki zamknąć, wstawić do lodówki i zużyć w ciągu 24 godzin.

Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

Skład
Woda, marchew 26%, ryż 2%, syrop glukozowy, sól jodowana, cytrynian sodu, cytrynian potasu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Wartości odżywcze

wartość energetyczna kJ/kcal
tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
białko
sól

Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

sód

potas

Osmolarno??: 240 mOsmol/l

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podawać po 4 miesiącu - wcześniejsze użycie tylko wg wskazań lekarza.
- Przeciwwskazaniem do stosowania jest: ostra i przewlekła niewydolność nerek, alkaloza metaboliczna, uporczywe wymioty, utrata przytomności/wstrząs, zaburzenia wchłaniania węglowodanów, niedrożność jelit.
- Nie podawać w przypadku alergii lub nietolerancji na którykolwiek ze składników produktu.

Dodatkowe informacje

- Gotowy do spożycia,
- Nie zawiera laktozy,
- Bezglutenowy,
- Bez dodatku białka mleka,
- Produkt nie jest przeznaczony do postępowania pozajelitowego.