

Hirudoid 0,3 g/100 g, maść, 100 g



Cena: 43,15 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	300 mg/100g
Opakowanie	100 g
Postać	maść
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Heparinoidum

Opis produktu

Wskazania

- Tępe urazy z krwinkami lub bez krwinek.
- Zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.
- Hirudoid maść może być również stosowany do fonoforezy. Przy jonoforezie maść jest podawana pod katodę.

Dawkowanie

- Lek do stosowania miejscowego, na skórę.
- Nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści. Lek wmasować w miejsca zmienione chorobowo. W przypadku bolesnego zapalenia, maść należy delikatnie rozprowadzić na miejsca chorobowo zmienione. Maść może być używany jako opatrunek z maści.
- W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid może być również stosowany do fonoforezy. Podczas jonoforezy maść jest podawana pod katodę.

Skład

Substancją czynną leku jest polisaccharan mukopolisacharydowy 0,3 g, co odpowiada 25 000 j.* (*Jednostki ustalone na podstawie APTT).

Pozostałe składniki to: glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetostearylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość (uczulenie) na polisaccharan mukopolisacharydowy, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu

- lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Otwarte rany i uszkodzona skóra.

Działania niepożądane

- Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.
- Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. 4- hydroksybenzoesan metylu i propylu może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W temperaturze poniżej 25° C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek można stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.