

## Hirudoid 0,3 g/100 g, żel, 100 g



Cena: 54,90 zł

### Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	300 mg/100g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Heparinoidum

### Opis produktu

#### Wskazania

Do stosowania miejscowego na skórę w przypadku:

- Tępych urazów z krwinkami lub bez krwinków,
- Zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

#### Działanie

Hirudoid dzięki zawartości polisaccharanumukopolisacharydowego:

- Zapobiega tworzeniu się zakrzepów powierzchownych, stymuluje ich wchłanianie, wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe oraz przyspiesza wchłanianie krwinków i obrzęków.
- Przyczynia się do regeneracji struktur tkankowych.

#### Dawkowanie

- Hirudoid nakładać i wmasować na miejsca zmienione chorobowo 1-3 razy na dobę lub jeśli zachodzi potrzeba, to częściej.
- W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm żelu.

#### Skład

Substancją czynną leku jest mukopolisacharydowy polisaccharan.

Substancje pomocnicze to: sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na polisaccharanumukopolisacharydowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie należy nakładać żelu na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.