

# Hitaxa Bilastyna 20 mg, 10 tabletek



Cena: 14,99 zł

## Opis słownikowy

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Dawka             | 20 mg              |
| Opakowanie        | 10 tabletek        |
| Postać            | tabletki           |
| Producent         | ADAMED PHARMA S.A. |
| Rejestracja       | Lek                |
| Substancja czynna | Bilastinum         |

## Opis produktu

### Opis

Lek Bilastyna Hitaxa zawiera substancję czynną bilastynę, która działa przeciwhistaminowo. Stosowana w łagodzeniu objawów kataru siennego (kichanie, świąd, katar, zatłoczony nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek może być również stosowany do leczenia swędzących wysypek skórnych (pokrzywka).

### Wskazania

Lek Bilastyna Hitaxa jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki.

### Dawkowanie

- Zalecana dawka u dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 12 lat i powyżej to 1 tabletki (20 mg) na dobę.
- Tabletkę należy przyjmować jedną godzinę przed lub dwie godziny po jakimkolwiek posiłku lub wypiciu soku owocowego.

### Skład

Substancją czynną leku jest bilastyna w dawce 20 mg.

Pozostałe składniki: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

### Przeciwwskazania

Nie stosować leku Bilastyna Hitaxa jeśli pacjent ma uczulenie na bilastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.